

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SUPRAZOLE 200 EW es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción preventiva y curativa; también presenta actividad translaminar.

Ingrediente Activo/Concentración: Penconazole 200 g/L

Grupo Químico: Triazole

Clase de Uso: Fungicida

Tipo de formulación: Emulsión aceite en agua (EW)

Registro PQUA N°: 2383 – SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Formulado por:

RIDACHEM HONGKONG LIMITED

N° 29-31 Chueng Lee St. Chaiwan Hongkong

Teléfono: +86-25-8457 4660

Importado y distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.

Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa – La Molina

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto físico: Blanco

Olor: Olor aromático

Densidad: 1.05 +/- 0.07 g/ml

pH: 4 – 8 (solución al 1%)


Persistencia de espuma: Máximo 50 ml después de 1 minuto

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

3. MODO DE ACCIÓN

SUPRAZOLE 200 EW es un fungicida perteneciente al grupo de los triazoles y es utilizado para el control de Oidium en diversos cultivos. Actúa inhibiendo el adecuado desarrollo del hongo debido a cambios producidos en su membrana celular.



4. RECOMENDACIONES DE USO

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda si se emplea las dosis indicadas:

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/ Ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.075	0.15	30	0.2
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.05 – 0.06	0.25-0.3	30	0.2

PC: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

Presentaciones comerciales: Frasco x 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, galonera x 4 L, bidón x 20 L, cilindro x 200 L.

5. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Iniciar el tratamiento previa evaluación del cultivo, mediante aplicaciones preventivas cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo del patógeno o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda realizar como máximo hasta 3 aplicaciones por campaña/cultivo, con intervalo entre aplicaciones de 20 días.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

7. COMPATIBILIDAD

SUPRAZOLE 200 EW es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácidos u oxidantes.

8. FITOTOXICIDAD

SUPRAZOLE 200 EW no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

9. TOXICIDAD AGUDA EN MAMÍFEROS

Toxicidad aguda / estudios de irritación:

Ruta de entrada:

Ingestión: DL50, oral rata: > 2500 mg/kg
Piel: DL50, dermal, rata: > 4000 mg/kg;
Inhalación: CL 50 (4h), rata: > 5.0 mg/l;

Irritación: No irritante a la piel
Ligeramente irritante a los ojos

Sensibilización: Leve sensibilizante cutáneo en cobayos

Categoría Toxicológica: III. Ligeramente Peligroso – Cuidado

10. PRECAUCIONES DE USO

Este producto es de cuidado, no ingerir.

Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersion.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas deber utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398
0800-5-0847

ESSALUD: 117 (gratuito)

CISPROQUIM: