

GERONIMO[®]

70 WP

Insecticida
PQUA N° 551-SENASA

GERONIMO[®] es un insecticida de acción sistémica y translaminar que actúa por contacto e ingestión en el control de insectos, picadores, chupadores y minadores de hojas. Tiene efecto sobre el sistema nervioso del insecto, ocasionando parálisis y muerte en un periodo corto. **GERONIMO**[®] por su alta concentración de activo trabaja a dosis muy bajas por hectárea

COMPOSICIÓN

Acetamiprid 700 g/kg

MODO DE ACCIÓN

GERONIMO[®] es un producto sistémico, que actúa por contacto e ingestión. En la planta es absorbido muy bien por el follaje mostrando una excelente actividad sistémica y translaminar, que permite el control de insectos que están ubicados en el envés de la hoja. Es por ello que **GERONIMO**[®] es una buena alternativa para el control de insectos picadores, chupadores y minadores de las hojas

MECANISMO DE ACCIÓN

GERONIMO[®] actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, como un análogo de la acetil colina que es un transmisor químico natural de los impulsos nerviosos, su mecanismo de acción consiste en que ataca una proteína receptora de la acetil colina en la membrana de post sinapsis. Posteriormente ocasiona parálisis y muerte del insecto en un periodo corto

COMPATIBILIDAD

GERONIMO[®] es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO: Ligeramente peligroso

DL ₅₀ Oral Aguda:	LD ₅₀ (rata) 1064 mg/kg
DL ₅₀ Dermal Aguda:	LD ₅₀ (rata) > 2000 mg/kg
DL ₅₀ Inhalatoria:	LC ₅₀ (rata) > 2.88 mg/l aire
Irritación dermal:	No irritante a la piel
Irritación Ocular:	Levemente irritante a los ojos

METODO DE EMPLEO

Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con agua, luego vaciar al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, de acuerdo al cultivo. Agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

El número de aplicaciones va a depender del grado de infestación de la plaga generalmente, realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña y los momentos de aplicación van a depender del nivel de daño económico.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado y vierta la solución en la mezcla de aplicación.

PRESENTACIÓN

Sobre de 50 gramos

RECOMENDACIÓN DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/cil	kg/ha		
Algodón	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	40-50	0.1 - 0.125	14	0.5
Espárrago	Mosquilla de los brote	<i>Prodiplosis longifila</i>	40-60	0.12- 0.18	7	0.01
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	30-50	0.06-0.1	7	0.3
Palto	Queresa del palto	<i>Fiorinia fiorinae</i>	30-50	0.06-0.1	14	0.01

LMR. Límite máximo de residuos

Productor:



País

China